

## 上海グリーンクリニック 予防接種一覧表

| ワクチン   | 対象  | 接種間隔  | 副反応・注意点   |
|--|---|---|---|
| A型肝炎<br>HEPATITIS A<br>(中国製)   | 16歳～  | ①初回接種<br>②6～18ヶ月後に2回目   | ・副反応はほとんどありませんが、ごくまれに接種部位の発赤、疼痛や、全身倦怠感がみられることがあります。   |
| B型肝炎<br>HEPATITIS B<br>(中国製)   | 0歳～   | ①初回接種<br>②1ヶ月後に2回目<br>③初回から6ヶ月後に3回目   |   |
| 肺炎球菌ワクチン(13価)<br><br>PCV13<br>(アイルランド製)  | 初回免疫:<br>生後2ヶ月～6ヶ月<br>追加免疫:<br>1歳～1歳3ヶ月の間のみ               | 初回免疫:<br>①②③1ヶ月間隔で3回<br>追加免疫:<br>1歳～1歳3ヶ月の間に1回  | ・まれに接種部位にしこり(硬結)が残ることがあります。<br>・まれに発熱、接種部位の発赤、腫脹が見られることがあります。   |
|  | ※中国では7ヶ月になると接種対象から外れます。<br>※また、2・3回目の接種が7ヶ月以降の場合も接種できません。 |   |   |
| 五種混合<br>(百日咳・ジフテリア・破傷風<br>+Hib+ポリオ)<br>(フランス製)                                   | 生後3ヶ月～<br>(希望により2ヶ月から可能)                                  | 初回免疫:<br>①②③1ヶ月間隔で3回<br>追加免疫:<br>初回免疫終了後<br>1年～1年半後に1回  | ・一両日中、発熱をみることがあるほか、接種部位に硬結がみられ、しばらく続くことがあります。<br>・不安、眠気、下痢、食欲不振などがみられることがあります。  |
| 日本脳炎<br>JAPANESE ENCEPHALITIS<br>(中国製)   | 生後8ヶ月～  | ① 初回接種<br>②1週間後に2回目<br>③2回目から1ヶ月～1年以内に3回目<br>※初回接種が1歳未満の場合、<br>3回目は2歳以降                                       | ・まれに発熱、接種部位の発赤、腫脹が見られることがあります。<br>(参考:追加3～4年毎)  |
| ★MMR<br>(麻疹・おたふく・風疹の混合)<br>(中国製)   | 生後8ヶ月～  | 生後8ヶ月～1歳5ヶ月: ①初回接種<br>②1歳6ヶ月から<br>③6歳から<br>1歳6ヶ月から: ①初回接種<br>②6歳から<br>※日本では小学校入学前(5-6歳)に追加接種<br>※大人の2回目は医師と相談 | ・1～2週間後に発熱、発疹、耳下腺の腫脹がみられることがあります。<br>・まれに関節炎が起こることもあります。<br>・ごくまれに、熱性けいれん、脳炎が起こることがあります。<br>・妊娠予定の方は接種前約1ヶ月間避妊したのち接種できます。<br>・妊娠予定の方は接種後、約3ヶ月妊娠しないよう注意してください。 |
| ★水痘 (水ぼうそう)<br>VARICELLA-ZOSTER<br>(中国製)   | 1歳～   | 1歳～12歳: ①初回接種<br>②初回から3年後に2回<br>13歳以上: ①初回接種<br>②初回から4～8週間の間に2回目  | ・まれに軽い発疹、発熱がみられることがあります。<br>・妊娠予定の方は接種前約1ヶ月間避妊したのち接種できます。<br>・妊娠予定の方は接種後、約3ヶ月妊娠しないよう注意してください。   |
| 狂犬病<br>RABIES PRE EXPOSURE<br>(中国製)  | 1歳～   | 暴露前免疫:<br>①初回接種<br>②初回から7日後に2回目<br>③初回から21～28日の間に3回目<br>④3回目から12ヶ月後に4回目                                       | ・まれに軽い頭痛、吐気、筋肉痛や、接種部位の発赤、腫脹がみられることがあります。<br>(参考:追加3～5年毎)  |
| 4価HPV<br>HUMAN PAPILLOMAVIRUS<br>Types: 6・11・16・18<br>(アメリカ製)                    | 9～45歳 女性  | ①初回接種<br>②2ヶ月後に2回目<br>③初回から6ヶ月後に3回目   | ・接種部位の発赤、疼痛や、全身倦怠感がみられることがあります。<br>(ギランバレー症候群、急性散在性脳髄膜炎などは頻度不明)   |
| 9価HPV<br>HUMAN PAPILLOMAVIRUS<br>Types: 6・11・16・18・<br>31・33・45・52・58<br>(アメリカ製) | 16～26歳 女性   | ①初回接種<br>②2ヶ月後に2回目<br>③初回から6ヶ月後に3回目   | ・接種部位の発赤、疼痛や、全身倦怠感がみられることがあります。<br>(ギランバレー症候群、急性散在性脳髄膜炎などは頻度不明)   |

\*妊娠中の生ワクチン(★)の接種は禁忌です。

\*予防接種はお早めにご予約ください。ワクチンの入荷状況によっては、受付できない場合もございますのでご了承ください。

\*お子様の場合は『母子手帳』を忘れずにお持ちください。