

上海グリーンクリニック 予防接種一覧表

ワクチン	対象	接種間隔	副反応・注意点
A型肝炎 (不活化) HEPATITIS A (アメリカ製:MSD)	1～17歳	①初回接種 ②6～18ヶ月後に2回目	
A型肝炎 1.0ml (不活化) HEPATITIS A (中国製:科兴)	16歳～	①初回接種 ②6ヶ月後に2回目	・副反応はほとんどありませんが、ごくまれに接種部位の発赤、疼痛や、全身倦怠感がみられることがあります。
B型肝炎 (不活化) HEPATITIS B (中国製:金坦)	0歳～	①初回接種 ②1ヵ月後に2回目 ③初回から6ヶ月後に3回目	
肺炎球菌ワクチン (13価) PCV13 PREVENER13 (アイルランド製:Pfizer)	生後 6週～5歳	2～6ヶ月 4回 7～11ヶ月 3回 12～23ヶ月 2回 2～5歳 1回	
五種混合 DPT+ Hib+ポリオ (百日咳・ジフテリア・破傷風 +Hib+ポリオ) PENTAXIM (フランス製:SANOFI PASTEUR)	生後3ヶ月～ (希望により2ヶ月から可能)	初回免疫: ①②③ 1ヶ月間隔で3回 追加免疫: 初回免疫終了後 1年～1年半後に1回	・一両日中、発熱をみることがあるほか、接種部位に硬結がみられ、しばらく続くことがあります。 ・不安、眠気、下痢、食欲不振などが見られることがあります。
日本脳炎(不活化) JAPANESE ENCEPHALITIS (中国製:辽宁成大)	生後8ヶ月～	①初回接種 ②1週間後に2回目 ③3回目は2回目から1ヶ月～1年以内 *初回接種が1歳未満の場合、3回目は2歳以降	・まれに発熱、接種部位の発赤、腫脹が見られることがあります。
★MMR (生) (麻疹・おたふく・風疹の混合) (中国製:上海生物制品)	生後8ヶ月～	生後8ヶ月～1歳5ヶ月: ①初回接種 ②1歳6ヶ月から ③6歳から 1歳6ヶ月から: ①初回接種 ②6歳から *日本では小学校入学前年(5～6歳)で追加接種 *大人の2回目は医師と相談	・1～2週間後に発熱、発疹、耳下腺の腫脹がみられることがあります。 ・まれに関節炎が起こることもあります。 ・ごくまれに、熱性けいれん、脳炎が起こることがあります。 ・妊娠予定の方は接種前約1ヶ月間避妊したのち接種できます。 ・妊娠予定の方は接種後約3ヶ月妊娠しないよう注意してください。
★水痘 (水ぼうそう) (生) VARICELLA-ZOSTER (中国製:长春百克)	1歳～	1歳～12歳: ①初回接種 ②初回から3年後に2回目 13歳又13歳以上: ①初回接種 ②初回から4～8週間隔で2回目	・まれに軽い発疹、発熱がみられることがあります。 ・妊娠予定の方は接種前約1ヶ月間避妊したのち接種できます。 ・妊娠予定の方は接種後約3ヶ月妊娠しないよう注意してください。
狂犬病 (不活化) RABIES PRE EXPOSURE (中国製:辽宁成大)	1歳～	暴露前免疫: ①初回接種 ②初回から7日後に2回目 ③初回から21～28日後に3回目	・まれに軽い頭痛、吐気、筋肉痛や、接種部位の発赤、腫脹がみられることがあります。 (参考:感染リスクが高い方には、4回目の接種は、三回目より一年後に行い、以後2-5年毎の追加接種を推奨します。)
4価HPV (不活化) HUMAN PAPILLOMAVIRUS Types6,11,16,18 GARDASIL4 (アメリカ製:MSD)	9～45歳 女性	①初回接種 ②2ヵ月後に2回目 ③2回目から4ヶ月後に3回目	・接種部位の発赤、疼痛や、全身倦怠感がみられることがあります。 (ギランバレー症候群、急性散在性脳髄膜炎などは頻度不明)
9価HPV (不活化) HUMAN PAPILLOMAVIRUS Types6,11,16,18, 31,33,45,52,58 GARDASIL9 (アメリカ製:MSD)	9～45歳 女性	①初回接種 ②2ヵ月後に2回目 ③2回目から4ヶ月後に3回目	・接種部位の発赤、疼痛や、全身倦怠感がみられることがあります。 (ギランバレー症候群、急性散在性脳髄膜炎などは頻度不明)

*妊娠中の生ワクチン(★)は禁忌です。

*予防接種はお早めにご予約ください。ワクチンの在庫がない場合には、お待たせすることがありますのでご了承ください。

*お子様の場合は『母子手帳』を忘れずにお持ちください。