

## 上海グリーンクリニック 予防接種一覧表

ワクチン		対象	接種間隔	副反応・注意点	
A型肝炎 (不活化) HEPATITIS A (中国製:科兴)	0.5ml IM	1歳6ヶ月～15歳	①初回接種 ②6ヶ月後に2回目	・副反応はほとんどありませんが、ごくまれに接種部位の発赤、疼痛や全身倦怠感がみられることがあります。	
★A型肝炎 (不活化) HEPATITIS A (中国製:科兴)	1ml IM	16歳～	①初回接種 ②6ヶ月後に2回目		
★B型肝炎 (不活化) HEPATITIS B (中国製:金坦)	1ml IM	0歳～	①初回接種 ②1ヶ月後に2回目 ③初回から6ヶ月後に3回目		
肺炎球菌ワクチン(13価) PCV13 (アイルランド製:Pfizer)	0.5ml IM	生後 6週～5歳	2～6ヶ月 4回 7～11ヶ月 3回 12～23ヶ月 2回 2～5歳 1回	①②③(初回免疫)1ヶ月間隔で3回 ④追加:1歳～1歳3ヶ月の間 ①②(初回免疫)1ヶ月間以上の間隔 ③1歳以降 2回目から2ヶ月間以上の間隔 ①② 2ヶ月間以上の間隔	・まれに接種部位にしこり(硬結)が残ることがあります。 ・まれに発熱、接種部位の発赤、腫脹が見られることがあります。
五種混合 (DPT[百日咳・ジフテリア・破傷風] + Hib+ポリオ) (フランス製:SANOFI PASTEUR)	0.5ml IM	生後2ヶ月～2歳	初回免疫:①②③1ヶ月間隔で3回 追加免疫:1歳6ヶ月に1回追加接種	・一両日中、発熱をみることもあるほか、接種部位に硬結がみられ、しばらく続くことがあります。 ・不安、眠気、下痢、食欲不振などがみられることがあります。	
★日本脳炎 (不活化) JAPANESE ENCEPHALITIS (中国製:辽宁成大)	0.5ml IM	生後8ヶ月～	① 初回接種 ②1週間後に2回目 ③3回目は2回目から1ヶ月～1年以内 ※初回接種が1歳未満の場合、3回目は2歳以降	・まれに発熱、接種部位の発赤、腫脹が見られることがあります。	
★MMR (生) (麻疹・おたふく・風疹の混合) (中国製:上海生物制品)	0.5ml SC	生後8ヶ月～	生後8ヶ月～1歳5ヶ月:①初回接種 ②1歳6ヶ月から ③6歳から 1歳6ヶ月から:①初回接種 ②6歳から ※日本では小学校入学前(5-6歳)に追加接種 ※大人の2回目は医師と相談	・1～2週間後に発熱、発疹、耳下腺の腫脹がみられることがあります。 ・まれに関節炎が起こることもあります。 ・ごくまれに、熱性けいれん、脳炎が起こることがあります。 ・妊娠予定の方は接種前、約1ヶ月間避妊したのち接種できます。 ・妊娠予定の方は接種後、約3ヶ月妊娠しないよう注意してください。	
★水痘(水ぼうそう) (生) VARICELLA-ZOSTER (中国製:长春百克)	0.5ml SC	1歳～	1歳～12歳: ①初回接種 ②初回から3年後に2回目 13歳以上: ①初回接種 ②初回から4～8週間隔で2回目	・まれに軽い発疹、発熱がみられることがあります。 ・妊娠予定の方は接種前、約1ヶ月間避妊したのち接種できます。 ・妊娠予定の方は接種後、約3ヶ月妊娠しないよう注意してください。	
狂犬病 (不活化) RABIES PRE EXPOSURE (中国製:辽宁成大)	0.5ml IM	1歳～	暴露前免疫: ①初回接種 ②初回から7日後に2回目 ③初回から21～28日の間に3回目	・まれに軽い頭痛、吐気、筋肉痛や接種部位の発赤、腫脹がみられることがあります。 (参考:感染リスクが高い方には、3回目より1年後に4回目の接種を行い、以後2～5年毎の追加接種を推奨します。)	
沈降破傷風トキソイド TETANUS VACCINE ADSORBED (中国製:成都欧林)	0.5ml IM	0歳～	①初回接種 ②1回目から1～2ヵ月間隔で2回目接種 ③初回から1年後に1回追加接種 ※10年毎1回追加(特別な場合は5年毎1回追加)	・接種部位の発赤、腫脹、疼痛、硬結、発熱、悪寒、頭痛、全身倦怠感がみられることがあります。 ・妊婦は妊娠4ヶ月から接種が可能です。 接種例: ①妊娠4ヶ月 ②妊娠6～7ヵ月 接種スケジュールは医師と相談。	
9価HPV (不活化) HUMAN PAPILLOMAVIRUS Types: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 (アメリカ製:MSD)	0.5ml IM	女性 9～45歳 男性 16～26歳	①初回接種 ②2ヶ月後に2回目 ③2回目から4ヶ月後に3回 ※9～14歳の女性は2回接種スケジュールを推奨 初回から6～12ヶ月間隔で2回目接種	・接種部位の発赤、疼痛や全身倦怠感がみられることがあります。 (グランバレー症候群、急性散在性脳髄膜炎などは頻度不明)	

★印のワクチンは妊娠中は禁忌です。

\*予防接種はお早めにご予約ください。ワクチンの入荷状況によっては、受付できない場合もございますのでご了承ください。

\*お子様の場合は『母子手帳』を忘れずにお持ちください。